

## Blauwe kiekendieven en kou

door Pieter Wouters

Tijdens de afgelopen winter '96/'97 viel het me op dat ik toch met enige regelmaat Blauwe Kiekendieven zag. Daarom heb ik nu eens terug gezocht hoe dat in 8 voorgaande winters was. Deze periode is geheel bepaald door het feit dat deze aantekenboekjes nog beneden lagen en dat in deze winters door mij ongeveer evenveel is gevogeld.

In onderstaande tabel zien we de verschillende winters weergegeven. Daaruit blijkt al duidelijk dat er winters zijn die er uit springen, waaronder ook de afgelopen winter. Als we kijken naar het vorstgetal\*) van die winters dan blijkt daaruit dat we die winters ook als echte winter mogen beschouwen. Ook tijdens de wintertellingen van jan.'84 t/m jan.'86 lijkt dit op te gaan. Alleen de winter '85/'86, toch ook echt winters, komt er niet goed uit als het gaat over het aantal getelde Blauwe Kiekendieven. Mogelijk dat langdurige sneeuwbedekking daar iets mee heeft te maken. In '86 lag er in Brabant van 4 t/m 10 januari, net de periode voorafgaande aan de wintertelling, een gesloten sneeuwdek. Mogelijk heeft dat de kiekendieven verdreven naar gebieden zonder sneeuw.

Tabel 1: aantal Blauwe Kiekendieven waargenomen tijdens de winters 1989/90 t/m 1996/97 (betreft losse waarnemingen). Aangevuld met gegevens van wintertellingen voor de Provincie Noord-Brabant 1983/84 t/m 1985/86 (betreft gegevens wintervogeltellingen uit geheel Oost-Brabant.)

Winter	Vorstgetal	Aantal	n/100ha
83/84	13/6	10	0.008
84/85	13/6	10	0.023
85/86	40/1	7	0.005
89/90	3/0	0	
90/91	21/6	5	
91/92	?	1	
92/93	?	0	
93/94	?	0	
94/95	?	0	
95/96	12/1?	1	
96/97	23/8	5	

\*) Vorstgetal: Geeft een schatting van de hoeveelheid winterweer in de periode 1 november t/m 31 maart uitgedrukt op een 100-delige schaal (zie voor meer informatie de Ecologische atlas van de Nederlandse roofvogels, blz. 30).